

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Мелисон

Регистрационный номер: ЛС-002701

Торговое наименование: Мелисон

Международное непатентованное или группировочное наименование:
Мелиссы лекарственной травы настойка

Лекарственная форма:
Настойка

Состав:

Для приготовления настойки необходимо:

Активного вещества:

Мелиссы травы измельченной - 200 г

Вспомогательного вещества:

Этанола (этилового спирта) 40 % - достаточное количество для получения 1 л настойки.

Описание

Прозрачная жидкость от желтого цвета с коричневым оттенком до коричневого цвета с красным оттенком. При хранении возможно выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Седативное средство растительного происхождения.

Код АТХ: N05CM09

Фармакологические свойства

Оказывает мягкое успокаивающее действие.

Показания к применению

Повышенная нервная возбудимость, невроты, невротоподобные состояния.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; артериальная гипотензия; беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет.

С осторожностью

Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, эпилепсия.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Применяют внутрь, до еды, разводя в небольшом количестве воды по 15-20 капель 3 раза в день. Курс лечения - 2-3 недели. Возможно проведение повторного курса лечения после согласования с врачом.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. Вялость, сонливость, подавленность, снижение работоспособности (особенно в высоких дозах). Если любые из указанных побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При длительном применении препарата, в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление дозозависимых побочных эффектов. Лечение - симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Препарат усиливает действие снотворных, седативных средств и других лекарственных средств, угнетающих центральную нервную систему.

Особые указания

В случае индивидуальной непереносимости препарата, его заменяют препаратами валерианы. Содержание абсолютного этилового спирта в максимально разовой дозе препарата составляет 0,5 г, содержание абсолютного этилового спирта в максимальной суточной дозе препарата составляет 1,5 г. В одной капле препарата содержится 0,02 г абсолютного этилового спирта.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период лечения препаратом следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Настойка по 50 мл во флакон из стекла, укупоренный пробкой полиэтиленовой и навинчиваемой пластмассовой крышкой или колпачком алюминиевым.

По 100 мл во флакон из стекла, укупоренный колпачком алюминиевым.

Для стационаров: по 0,9 кг в бутылку из полиэтилена низкого давления непрозрачного цвета.

Для стационаров: по 4,5 кг, 9,0 кг, 18,0 кг в канистру из полиэтилена низкого давления непрозрачного цвета.

На флакон, бутылку, канистру наклеивают самоклеящуюся этикетку.

Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению вкладывают в пачку из картона для потребительской тары.

Флаконы в пачках, бутылки помещают в ящик из гофрированного картона или коробку из картона для потребительской тары.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.